

Подготовка к УЗИ брюшной полости

Последний прием пищи- легкий ужин или за 6-8 часов до исследования.

Накануне исключить продукты, повышающие газообразование в кишечнике (овощи - капуста, виноград, соки, молоко, черный хлеб).

Эспумизан 2 таблетки 3 раза в день за 2 дня до исследования.

8 800 707 77 06

г.Армавир ул.Маркова, 343





ФЛЕБОЛОГ

клиника лазерной хирургии

Подготовка к УЗИ малого таза

Перед проведением трансабдоминального УЗИ врач попросит выпить до 1,5 литров жидкости, чтобы наполнить мочевой пузырь.

Это поможет сделать снимки более четкими и информативными.

При необходимости проведения трансвагинального УЗИ необходимо опорожнить мочевой пузырь накануне обследования, и сообщить врачу об имеющейся аллергии на латекс.

Если врач принял решение о проведении трансабдоминального и трансвагинального УЗИ, трансабдоминальное проводится в первую очередь

8 800 707 77 06

г.Армавир ул.Маркова, 343



Подготовка к УЗИ молочных желез

Специальной подготовки перед проведением УЗИ молочных желез не требуется.

Однако исследование рекомендуется проводить на 5-12 день менструального цикла, так как это значительно повышает его информативность.

За два дня перед обследованием исключить физиопроцедуры, лучевую и химиотерапию.

8 800 707 77 06

г.Армавир ул.Маркова, 343



Подготовка к УЗИ молочных желез

Специальной подготовки перед проведением УЗИ молочных желез не требуется.

Однако исследование рекомендуется проводить на 5-12 день менструального цикла, так как это значительно повышает его информативность.

За два дня перед обследованием исключить физиопроцедуры, лучевую и химиотерапию.

8 800 707 77 06

г.Армавир ул.Маркова, 343

